


## Corrigendum

Page 65, graphique 3.13 : le graphique a été corrigé et une note a été ajoutée afin de préciser les types de données utilisées dans le nouveau graphique.

Graphique 3.13. Mortalité infantile, 2015 et variation 1990-2015 (ou année la plus proche)



1. Moyenne sur 3 ans (1988-90 et 2013-15).

Note : Les données pour la majorité des pays se réfèrent à un seuil minimum de 22 semaines de grossesse (ou à un poids de 500 grammes à la naissance) pour neutraliser l'impact des différentes pratiques nationales de comptabilisation des nourrissons nés très prématurément, à l'exception des pays suivants : Australie, Canada, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique, Norvège et Portugal.

Source : Statistiques de l'OCDE sur la santé 2017.

Page 89, référence corrigée dans la source du Graphique 4.17. Surpoids mesuré (obésité comprise) chez les enfants d'âges divers, 2010 (ou année la plus proche) :

Source : *International Association for the Study of Obesity (2013)* ; *World Obesity Forum (2016, 2017)* ; *JUNAEB (2016) pour le Chili* ; *THL National Institute for Health and Welfare pour la Finlande*.

#### Remplacée par

Source : *International Association for the Study of Obesity (2013)* ; *World Obesity Federation (2016, 2017)* ; *JUNAEB (2016) pour le Chili* ; *THL National Institute for Health and Welfare pour la Finlande*.

**Page 106, Vécu des patients en soins ambulatoires, quatrième paragraphe, 9<sup>ème</sup> ligne, la Corée a été enlevée de la phrase :**


La Corée et la Norvège utilisent les indicateurs du vécu des patients dans le cadre de leurs mécanismes de paiement ou pour financer les allocations destinées à encourager l'amélioration de la qualité et les soins centrés sur les patients. L'Australie, le Canada, le Danemark, la France, le Royaume-Uni et la République tchèque s'en servent pour informer les autorités de réglementation de la santé à des fins d'inspection, de réglementation et/ou d'accréditation.

#### Remplacé par

La Norvège utilise les indicateurs du vécu des patients dans le cadre de leurs mécanismes de paiement ou pour financer les allocations destinées à encourager l'amélioration de la qualité et les soins centrés sur les patients. L'Australie, le Canada, le Danemark, la France, le Royaume-Uni et la République tchèque s'en servent pour informer les autorités de réglementation de la santé à des fins d'inspection, de réglementation et/ou d'accréditation.

**Page 109, Graphique 6.7 : la moyenne OCDE a été corrigée. Veuillez noter que ceci n'a pas d'impact sur l'emplacement de la barre rouge pour l'OCDE dans le graphique, car seule la valeur au-dessus de la barre a changé :**

**Graphique 6.7. Patients âgés de 65 ans et plus avec prescription de benzodiazépines ou médicaments apparentés à longue durée d'action, 2015 (ou année la plus proche)**



Source : *Statistiques de l'OCDE sur la santé 2017*.